DOSIS MÁS ABAJO

Reversión de anticoagulantes orales

COMIENZA AQUÍ · Suspende el fármaco y evalúa gravedad del sangrado
Reanima y controla el foco. Identifica fármaco, última dosis, función renal y exámenes. Si es seguro, espera la eliminación antes de operar.

¿Qué anticoagulante está activo?

Antagonista de vitamina K →	Sangrado vital con efecto activo: vitamina K IV lenta y CCP de cuatro factores. Si no hay CCP, usa plasma.
Dabigatrán →	Usa idarucizumab en sangrado vital, no controlado o si está indicado para cirugía de emergencia.
Inhibidor del factor Xa →	Discute CCP según vía local. Para andexanet, verifica indicación, disponibilidad y riesgo trombótico. Evítalo antes de heparinización prevista.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vitamina K1 y Kcentra · AVK Guía clínica	**Vitamina K1 5–10 mg IV lenta según folleto. Usa 10 mg si hay riesgo vital.** **Kcentra, UI de factor IX/kg IV, peso real hasta 100 kg:** **INR 2 a <4: 25 (máx. 2.500 UI)** **INR 4–6: 35 (máx. 3.500 UI)** **INR >6: 50 (máx. 5.000 UI)** [59] [28]
Plasma · sin CCP Guía clínica	**Plasma 10–15 mL/kg IV.** [59] [28]
Idarucizumab · dosis inicial Guía clínica	**5 g IV: dos frascos consecutivos de 2,5 g/50 mL.** [62] [61] [60]
Idarucizumab · repetición Guía clínica	**Si las pruebas de coagulación están prolongadas, considera otros 5 g IV ante resangrado, riesgo de resangrado vital o segundo procedimiento urgente.** [62]
CCP4 · Xa, fuera de ficha Según producto o evidencia	**CCP4 25–50 UI de factor IX/kg IV según protocolo hospitalario.** [60] [61] [66]
Andexanet · ficha EMA Guía clínica	**Baja: bolo IV 400 mg + 4 mg/min por 120 min.** **Alta: bolo IV 800 mg + 8 mg/min por 120 min.** **Bolo ≈30 mg/min. Baja si apixabán ≤5 mg, rivaroxabán ≤10 mg o última toma hace ≥8 h. Si dosis mayor y <8 h, alta. EMA no define esquema si falta dosis u hora.** [63] [64] [65]

Reevalúa y escala · Reevalúa control del foco y exámenes pertinentes. Acuerda cuándo reevaluar riesgo trombótico y reiniciar anticoagulación.

Alcance clínico · Usa el protocolo hospitalario aprobado. Las marcas son ejemplos. Confirma el producto y su disponibilidad. La suspensión electiva y los procedimientos neuroaxiales tienen criterios propios.

Fuentes [28] KCENTRA (DailyMed) • [59] ACC 2020 • [60] ISTH SSC 2024 • [61] ESAIC 2024 • [62] Praxbind · EMA • [63] Ondexxya · EMA • [64] FDA safety notice 2025 • [65] ISP Chile · Registro • [66] THANZ 2025